



**Как выявить ржавчину на подсолнечнике и сохранить урожай
Уважаемые сельхозтоваропроизводители!**



В I декаде июля в ряде северных районах области отмечено проявление ржавчины (*возбудитель ***Russinia helianthi****) на отдельных полях подсолнечника. Единичные уредопустулы (ржавые подушечки) ржавчины выявлены на нижних листьях растений подсолнечника. Уредоспоры сохраняют жизнеспособность до 6 месяцев.

Температура воздуха +6...28°C (оптимально +18...20°C), осадки, ветер, будут способствовать развитию и распространению заболевания. По мимо подсолнечника ржавчина поражает сорняк дурнишник, который так же может быть источником инфекции.

Вредоносность ржавчины заключается в уменьшении ассимиляционной деятельности листьев и преждевременном высыхании. Пораженные растения недоразвиваются и дают пониженный урожай. При средней и сильной степени развития ржавчины уменьшаются размеры корзинок, урожай семян и содержания жира в ядрах.

С целью своевременного выявления первичной инфекции рекомендуем проводить обследование посевов подсолнечника. Обработки против ржавчины (ЭПВ 3-5% пораженных растений) проводить согласно Реестру пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности. Обязательно заранее оповещать пасечников о планируемых обработках!

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области оказывает консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям в области защиты растений. По всем интересующим вопросам обращаться в районные отделы филиала или в областной отдел защиты растений по тел. 8 (8442) 97-77-21 доб. 702 / 8-995-428-20-29.

